

Žiadanka na prenatalný skrining - I. trimester

Rodné číslo:		Pečiatka odosielateľa:				
Priezvisko:						
Meno:						
Diagnózy:						
Poistovňa:						
Dátum a čas odberu:						
Dátum poslednej menštruácie	Dátum posledného USG	CRL/mm/	Gestačný vek /týždeň+deň/	Počet plodov		
Gemini	CRL1	CRL2	Gestačný vek	Plod1	Plod2	Hmotnosť matky/kg/
DS v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	Požadované vyšetrenie pre I. trimester PAPP-A				
NTD v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Inzulíndependetný DM	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
IVF	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Fajčenie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					

F PM3 OKBH 03/R-01-01.02.2016

Vykonanie vyšetrenia PAPP-A v materskom sére je optimálne v období 10+0 až 11+3 týždňa tehotenstva, ak sa odber urobí neskôr ako 13+6, výsledok sa nedá interpretovať.

Výsledok I.časti integrovaného skriningu je vo forme tlače s uvedením koncentrácie PAPP-A bez interpretácie.

Optimálne v období 15+0 až 16+0 je potrebné urobiť 2.časť integrovaného skriningu/samostatná žiadanka/

Výsledky z 1. a 2.časti sa vyhodnotia spoločne a pomocou špecifického softvéru ALPHA sa vypočíta riziko

Žiadanka na prenatalný skrining - I. trimester

Rodné číslo:		Pečiatka odosielateľa:				
Priezvisko:						
Meno:						
Diagnózy:						
Poistovňa:						
Dátum a čas odberu:						
Dátum poslednej menštruácie	Dátum posledného USG	CRL/mm/	Gestačný vek /týždeň+deň/	Počet plodov		
Gemini	CRL1	CRL2	Gestačný vek	Plod1	Plod2	Hmotnosť matky/kg/
DS v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	Požadované vyšetrenie pre I. trimester PAPP-A				
NTD v predchádzajúcom tehotenstve	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Inzulíndependetný DM	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
IVF	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					
Fajčenie	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie					

F PM3 OKBH 03/R-01-01.02.2016

Vykonanie vyšetrenia PAPP-A v materskom sére je optimálne v období 10+0 až 11+3 týždňa tehotenstva, ak sa odber urobí neskôr ako 13+6, výsledok sa nedá interpretovať.

Výsledok I.časti integrovaného skriningu je vo forme tlače s uvedením koncentrácie PAPP-A bez interpretácie.

Optimálne v období 15+0 až 16+0 je potrebné urobiť 2.časť integrovaného skriningu/samostatná žiadanka/

Výsledky z 1. a 2.časti sa vyhodnotia spoločne a pomocou špecifického softvéru ALPHA sa vypočíta riziko